



Bovinos

Dectiver® Premium

Solución inyectable Endectocida de larga acción

REG. SAGARPA Q-2083-131

FORMULA:

Cada mL contiene:

Ivermectina	31.5 mg
Vehículo, c.b.p.	1 mL.

INDICACIONES:

DECTIVER® PREMIUM es una solución estéril de ivermectina al 3.15% lista para usarse que presenta una absorción lenta y una alta biodisponibilidad en proteínas plasmáticas y en hígado y tejido adiposo, que permite un efecto terapéutico prolongado de hasta 100 días, no obstante la sobrevivencia prolongada de los parásitos en el ambiente y las reinfestaciones constantes de los animales.

Está indicado en el tratamiento de los nemátodos gastro-intestinales y pulmonares y adyuvante en el control de los parásitos externos por la garrapata (*Boophilus microplus*), ácaros y piojos de bovinos en pastoreo o estabulados cuando el consumo de carne y leche sea en un tiempo mayor a 120 días. Ayuda a mejorar su eficiencia en la conversión alimenticia y ganancia de peso coadyuvante a tener un mayor peso a mercado.

DECTIVER® PREMIUM contiene como principio activo la ivermectina mezcla de componentes; ivermectina B_{1a} (5-O-dimetil-22,23-dihidroavermectina A_{1a}) e ivermectina B_{1b} (5-O-dimetil-25-de (1-metil-propil)-22,23-dihidro-25-(1-metiletil) avermectina A_{1a}).

La ivermectina es un derivado semisintético de la familia de las avermectinas, las cuales fueron las primeras comercializadas como endectocidas. A pesar de que las avermectinas no tienen actividad contra cestodos y tremátodos, ellos han resultado ser altamente efectivos en contra de estadios adultos y larvas hipobióticas de nemátodos gastrointestinales, pulmonares y muchos otros artrópodos parásitos.

La ivermectina es la mezcla de 4 componentes principales (avermectina A_{1a}, A_{2a}, B_{1a}, B_{2a}), y de cuatro componentes secundarios recuperados en una cantidad mínima (avermectina A_{1b}, A_{2b}, B_{1b}, y B_{2b}) de estos componentes B_{1a} es recuperado en gran cantidad con su homólogo secundario B_{1b}.



El componente B_{1a}, comúnmente conocida como ivermectina, es la de mayor importancia debido a su alta potencia contra un amplio espectro de endo y ectoparásitos de los animales domésticos.

USO EN:

Bovinos y ovinos.

DOSIS Y VÍA DE ADMINISTRACIÓN:

Bovinos y ovinos: La dosis recomendada de DECTIVER® PREMIUM en bovinos y ovinos es de 630 µg por kg de peso corporal. La solución al 3.15% se aplica a razón de 1 ml por 50 kg de peso corporal; se debe administrar únicamente por vía subcutánea.

Se recomienda en bovinos en pastoreo y estabulados siempre y cuando la administración del producto sea antes de los 122 días (para que la leche Eliminar) para que la carne sea destinada a consumo humano.

Se recomienda en ovinos para pie de cría.

La única vía recomendada de administración de DECTIVER® PREMIUM es la vía subcutánea a nivel del cuello o por delante de la paleta. DECTIVER® PREMIUM puede ser administrado con una jeringa de tipo automática o convencional.





Bovinos

ADVERTENCIAS:

No consumir carne de los animales tratados hasta 122 días después de la última aplicación.

No se administre este producto a bovinos en producción láctea para consumo humano.

Debido a la toxicidad que representa la ivermectina a los organismos acuáticos, los envases y sus residuos deben desecharse en forma segura, enterrándolos y/o incinerándolos.

Almacénese en un lugar fresco y seco protegido de la luz.

No se debe aplicar por vía intramuscular o intravenosa.

Manténgase fuera del alcance de los niños.

PRESENTACIONES:

Frasco de plástico con 500 mL.

CONSULTE AL MÉDICO VETERINARIO

SU VENTA REQUIERE RECETA MÉDICA

USO VETERINARIO