



# Bovinos

## LOMO PON S®

Insecticida, mosquicida

Reg. RSCO-PEC-INAC-0156-395-378-007

### FORMULA:

INGREDIENTE ACTIVO	% en peso
PERMETRINA: 3-fenoxibencil (1RS) –CIS , trans -3- (2,2-diclorovinil)- 2,2-dimetil ciclopropano carboxilato (Equivalente a 64.9 gr de I.A./L) no menos de: 7.40 %	
BUTOXIDO DE PIPERONILO no menos de: 7.40 %	

### INGREDIENTES AROMATICOS

VEHÍCULO	no más de: 85.20%
TOTAL	100.00 %

### INDICACIONES:

Es un producto a base de un piretroide y un sinergista, con acción sobre poblaciones de moscas de la paleta o del cuerno.

La permetrina es un piretroide que posee acción neurotóxica sobre las membranas nerviosas de los ectoparásitos, provocando excitación, trastornos de coordinación, parálisis y muerte.

El efecto sinergista del butóxido de piperonilo sobre las enzimas de la resistencia, previene la degradación de la permetrina multiplicando su acción.

### USO EN:

LOMO PON S® es un producto formulado para su aplicación pour on. Tiene acción sobre los principales parásitos del ganado:

Mosca del cuerno o de la paleta: *Haematobia irritans*.

Mosca del establo o mosca brava: *Stomoxys calcitrans*.

Mosca doméstica, tábanos y mosquitos.

Piojos chupadores: *Haematopinus eurysternus*, *H. suis*, *Lignogatus vitulli*, *Solenopotes capillatus*.

Piojos masticadores: *Melophagus spp*; *Damalinia spp*.



### DOSIS Y VÍA DE ADMINISTRACIÓN:

Aplicar en una franja desde la cruz hasta la grupa.

En animales de peso menor a los 200 kg aplicar 10 mL.

En animales de peso mayor a los 200 kg aplicar 20 mL.

### ADVERTENCIAS:

Periodo de retiro en carne y leche: cero días.

Almacenar en lugar fresco y seco.

Manténgase fuera del alcance de los niños.

### PRESENTACIONES:

1 y 5 litros.

### CONSULTE AL MÉDICO VETERINARIO

### USO VETERINARIO

