



# Ovinos

## Dectiver® -F

Endectocida y Fasciolicida de amplio espectro

(Solución inyectable de Ivermectina y Clorsulón)

REG. SAGARPA Q-2083-009

### FÓRMULA:

Cada mL contiene:

Ivermectina 10 mg  
Clorsulón 100 mg  
Vehículo c.b.p. 1 mL

### USO EN:

Bovinos y ovinos.

### DESCRIPCIÓN:

DECTIVER® -F es una solución estéril inyectable de Ivermectina y Clorsulón lista para usarse. Está indicado en el tratamiento de los parásitos internos y incluyendo a la fasciola tanto en su etapa larvaria como adulta y como coadyuvante en el control de los parásitos externos de bovinos y ovinos por lo que ayuda a mejorar su eficiencia en la conversión alimenticia y ganancia de peso coadyuvando a tener un mayor peso a mercado. Se administra por vía subcutánea a nivel del cuello o por delante de la paleta.

### INDICACIONES:

DECTIVER® -F es efectivo en el tratamiento y control de los estados adultos y larvarios de los parásitos internos hasta por 28 días según el parásito incluyendo la fasciola así como los parásitos externos en el ganado bovino .

DECTIVER® -F actúa en el control eficaz de los siguientes parásitos de los bovinos y ovinos:

*Ostertagia ostertagi* (incluye etapa hipobiótica)  
*Ostertagia spp*  
*Bunostomun phlebotomun*  
*Cooperia spp*  
*Haemonchus spp*  
*Oesophagostomum spp*  
*Trichostrongylus spp*  
*Nematodirus spp*



*Toxocara vitulorum*  
*Mecistocirrus digitatus*  
*Strongyloides papillosus*  
*Chabertia ovina*  
*Trichuris ovis*  
*Dictyocaulus spp*  
*Parafilaria bovicola*  
*Thelazia spp*  
*Protostrongylus rufescens*

### Fasciola:

*Fasciola hepática*  
*Fasciola gigántica*

### Controla los siguientes parásitos externos:

#### Larvas de mosca:

*Hipoderma bovis*  
*H. lineatum*  
*Dermatobia hominis*  
*Oestrus ovis*  
*Chrysomyia bezziana*

#### Acaros productores de sarna:

*Psoroptes ovis var bovis*  
*P. communis var ovis*  
*Choriotes bovis*





# Ovinos

**Contra piojos:**

*Haematopinus eurysternus*  
*Solenopotes capillatus*

**Auxiliar en el control de:**

*Damalinia bovis*

**VÍA DE ADMINISTRACIÓN:**

La única vía recomendada de administración de DECTIVER® -F es la vía subcutánea a nivel del cuello o por delante de la paleta en el ovino en la región axilar.

DECTIVER® -F puede ser administrado con una jeringa de tipo automática o convencional.

**DOSIS:**

Bovinos y ovinos: 1 mL por cada 50 kg de peso vivo.

**ADVERTENCIAS:**

No se debe aplicar por vía intramuscular o intravenosa.

Manténgase fuera del alcance de los niños.

Manténgase en un lugar fresco y no se exponga a los rayos de sol.

No debe usarse éste producto 28 días antes del sacrificio de animales destinados para consumo humano. No utilizar para consumo humano la leche de animales tratados hasta 28 días después de la última aplicación.

Los organismos acuáticos son altamente sensibles a la toxicidad de la Ivermectina por lo cual los recipientes vacíos y cualquier contenido residual deberán de ser desechados en forma segura enterrándolos o incinerándolos

**PRESENTACIONES:**

Fascos de plástico de 500 mL.

**USO VETERINARIO.****CONSULTE AL MÉDICO VETERINARIO.****SU VENTA REQUIERE RECETA MEDICA**