



# Porcinos

## Duogestal®

Inductor y sincronizador de estro en cerdas

### USO VETERINARIO

Reg. SAGARPA Q-2083-173

**Duogestal®** es una asociación hormonal liofilizada de Gonadotropina Coriónica Equina y Gonadotropina Coriónica Humana (eCG + hCG) especialmente formulado para obtener óptimos resultados en la inducción de celo y ovulación en cerdas.



### FÓRMULA :

Cada 5 mL contienen:

Gonadotropina coriónica equina (eCG)  
Gonadotropina coriónica humana (hCG)  
Vehículo c.b.p.

400 U.I.  
200 U.I.  
5 mL

### MODO DE ACCIÓN

La eCG estimula el desarrollo del folículo (acción FSH= hormona folículo estimulante) mientras la hCG favorece la ovulación y la formación del cuerpo lúteo (acción LH= hormona luteinizante), obteniendo como resultado de esta complementación una mejor inducción y sincronización de estro y ovulación, lo cual permite reconstituir el ciclo estral de modo fisiológico.

### INDICACIONES

Inducción y sincronización de celo y ovulación en cerdas prepúberes, cerdas nulíparas, cerdas multíparas post destete y cerdas en anestro. Subfertilidad e infertilidad de origen no infeccioso en cerdas; anestro o ausencia de manifestaciones estrales post destete que superen los 10 días a partir del mismo y cerdas prepúberes que no presenten celo hasta 8 meses de edad.

	Indicación	Momento del tratamiento
Cerdas adultas (Multíparas)	Inductor y sincronización del estro	0-3 días post-destete
	Anestro	10 días post-destete
Cerdas primerizas (Nulíparas)	Inducción del estro (prepúberes)	A los 5.5 a 6.5 meses de edad
	Sincronización del estro (clínicas)	A los 6-8 meses de edad
	Anestro	A los 8 - 10 meses de edad





# Porcinos

## DOSIS

Cerdas adultas y cerdas primerizas (núlparas o prepúberes): 5mL equivalente a 400 U.I. de Gonadotropina Coriónica Equina y 200 U.I. de Gonadotropina Coriónica Humana. La utilización del **Duogestal®** en todas las indicaciones mencionadas provoca celo a los 3-6 días post tratamiento, salvo en cerdas gestantes. En cerdas prepúberes es recomendable inseminar o dar servicio en el celo natural siguiente, que aparecerá sincronizado 28-30 días después de la aplicación del producto.

## VIA DE ADMINISTRACIÓN

Reconstituir el polvo liofilizado con el diluyente e inyectar el contenido del vial (5 ml) por vía subcutánea o intramuscular detrás de la oreja.

## ADVERTENCIAS:

No destinar para consumo humano la carne de animales tratados con este producto hasta 30 días después de la última aplicación.

Mantener a 2-8° C, protegido de la luz.

Manténgase fuera del alcance de los niños.

## PRESENTACIONES:

Caja con 5 dosis. Cada dosis un frasco con polvo liofilizado y diluyente de 5 mL.

## CONSULTE AL MÉDICO VETERINARIO

## SU VENTA REQUIERE RECETA MÉDICA CUANTIFICADA

## PARA USO EXCLUSIVO DEL MÉDICO VETERINARIO

ELABORADO POR:

**SYNTEX S.A.**

Luis de Sarro 501 (B1838DQK)

Luis Guillon, Buenos Aires

Argentina