



Porcinos

Porcimune® SOA

Vacuna inactivada para la prevención y control de la Enfermedad del Ojo Azul en cerdos sanos.

REG. SAGARPA B-2083-017

FORMULA:

Cada mL contiene:

Rubulavirus porcino cepa LPMV-SOA-CI y LPMV-SOA-CIII mínimo 1×10^6 U.F.P. inactivado químicamente y emulsionado con un adyuvante oleoso.

USO EN:

Cerdos sanos.

INDICACIONES:

Vacuna inactivada para la prevención y control de la Enfermedad del Ojo Azul en cerdos sanos.

DOSIS:

La dosis es de 2 ml y se debe de aplicar bajo el siguiente calendario:

Lechones: Aplicar una dosis entre las 6 y 8 semanas de vida y repetir la dosis dos semanas después.

Pie de Cría.

Reemplazos: Dos aplicaciones durante la adaptación o cuarentena. (Con intervalo de 2 semanas).

Hembras: Las hembras pueden vacunarse de manera segura en cualquier momento. Se sugieren los siguientes programas de vacunación:

Inicialmente dos aplicaciones con intervalo de 2 semanas y posteriormente cada 4 a 6 meses. (sábana).

Inicialmente dos aplicaciones con intervalo de 2 semanas y posteriormente una aplicación 3 semanas antes del parto.

Sementales: Inicialmente dos aplicaciones con intervalo de 2 semanas y posteriormente cada 4 a 6 meses.

VÍA DE ADMINISTRACIÓN:

Aplicar mediante inyección intramuscular profunda.



ADVERTENCIAS:

Una vez abierto el envase utilice el contenido completamente. Deseche el producto sobrante.

Agite el frasco antes de usarse.

Almacenar en refrigeración a una temperatura de entre 2° y 7 °C.

Cualquier biológico puede causar reacciones anafilácticas. En tal caso administrar antihistamínicos.

No vacunar 21 días antes del sacrificio de los animales destinados para consumo humano.

PARA USO EXCLUSIVO EN LOS ESTADOS AUTORIZADOS POR LA SAGARPA.

PRESENTACIÓN:

Frasco con: 50 dosis.

USO VETERINARIO

CONSULTE AL MÉDICO VETERINARIO

